

# Beriliosis, la enfermedad que se esconde tras algunas sarcoidosis

**Antonia Galán Dávila<sup>(1)</sup>; David Orts Giménez<sup>(2)</sup>; María Luz de la Sen Fernández<sup>(3)</sup>;  
Alejandro Muñoz Fernández<sup>(4)</sup>; Ana Isabel Gutierrez Rubio<sup>(5)</sup>; Eleuterio Llorca Martínez<sup>(6)</sup>**

<sup>1</sup>Sección de Neumología, Hospital General Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante, España

<sup>2</sup>Sección de Neumología, Hospital General Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante, España

<sup>3</sup>Servicio de Inmunología, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España

<sup>4</sup>Sección de Neumología, Hospital General Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante, España

<sup>5</sup>Sección de Neumología, Hospital General Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante, España

<sup>6</sup>Sección de Neumología, Hospital General Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante, España

## Correspondencia:

**Antonia Galán Dávila**

Dirección: C/ Ciudad Real 21, 1º A, 03005 Alicante, España

Teléfono: 679290417

Correo electrónico: agalandavila@yahoo.es

La cita de este artículo es: A Galán et al. Beriliosis, la enfermedad que se esconde tras algunas sarcoidosis. Rev Asoc Esp Espec Med Trab 2020; 29: 70-74

## RESUMEN.

La enfermedad crónica por berilio (BC) es una enfermedad pulmonar ocupacional causada por una reacción de hipersensibilidad retardada a dicho metal. El número de trabajadores expuestos a berilio (Be) se ha incrementado en los últimos años (en Estados Unidos ha pasado de 30.000 en 1970 a 200.000 apenas 30 años después) 1. Estudios transversales llevados a cabo en trabajadores expuestos en distintos tipos de industrias han encontrado prevalencias de la enfermedad que varían de 0% a 7,8%2. En este contexto es llamativo el escaso

CHRONIC BERYLLIUM DISEASE, THE DISEASE HIDDEN UNDER SOME SARCOIDOSIS.

## ABSTRACT

Chronic beryllium disease (CDB) is an occupational retarded hypersensitivity disease elicited by beryllium exposure. The number of exposed workers has increased in the last years. (in the USA has risen from 30,000 in the 1970s to 200,000 thirty years later)1. Cross-sectional studies of exposed workers in various industries have found that the prevalence of this illness ranged from 0.0 to 7.8%2. In this

número de beriliosis que se diagnostican, probablemente porque muchas de ellas son erróneamente diagnosticadas de sarcoidosis.

**Palabras clave:** Berilio; beriliosis; sarcoidosis.

context, it is remarkable that CBD is only rarely diagnosed, probably because many of them are misdiagnosed as sarcoidosis.

**Keywords:** Beryllium; chronic beryllium disease; sarcoidosis.

---

Fecha de recepción: 28 de diciembre de 2019

Fecha de aceptación: 22 de abril de 2020

---