

Factores que influyen en la duración de la prestación por riesgo durante el embarazo en las trabajadoras del ámbito sanitario. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: estudio descriptivo y transversal.

María Gabriela Torres Romero⁽¹⁾, Anais Elvira González Perfetti⁽²⁾, Hanna Hernández Hernández⁽³⁾, Isidro Rivadulla Lema⁽⁴⁾, Javier Sanz Valero⁽⁵⁾, María Cruz Guergué Gómez⁽⁶⁾

¹Unidad Docente de Medicina del Trabajo de Navarra, Pamplona; España.

²Unidad Docente de Medicina del Trabajo de Navarra, Pamplona; España.

³Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Islas Canarias. España.

⁴Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Galicia. España.

⁵Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.

⁶Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea. Pamplona. España.

**Primer premio a mejor comunicación tipo poster de médico residente en Medicina del Trabajo.
XI Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo.
Febrero de 2020.**

Correspondencia:

María Gabriela Torres Romero

Dirección: Unidad Docente de Medicina del Trabajo de Navarra.

Calle Mayor número 16, piso 2 puerta b. Villava. Navarra.

España. CP 31610.

Correo electrónico: mariagtorresromer@gmail.com

La cita de este artículo es: M.G. Torres Romero et al. Factores que influyen en la duración de la prestación por riesgo durante el embarazo en las trabajadoras del ámbito sanitario. Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea: estudio descriptivo y transversal. Rev Asoc Esp Espec Med Trab 2020; 29: 29-34

RESUMEN.

Objetivo: Identificar factores que influyen en la duración de la prestación por riesgo durante el embarazo en las trabajadoras del ámbito sanitario.

Material y Métodos: Estudio descriptivo y transversal. Se estudiaron las trabajadoras embarazadas del SNS- O, que notificaron su gestación desde 01 enero de 2017 hasta 31 diciembre de 2018. Las variables

FACTORS THAT INFLUENCE THE DURATION OF THE RISK BENEFIT DURING PREGNANCY IN WOMEN HEALTH WORKERS. NAVARRO HEALTH SERVICE - OSASUNBIDEA: DESCRIPTIVE AND CROSS-SECTIONAL STUDY

ABSTRACT

Objective: To identify factors that influence the duration of the risk during pregnancy benefit in female health workers.

fueron: centro de trabajo, profesión, tipo de contrato, tipo de guardias, y su relación con la duración de la prestación por riesgo durante el embarazo.

Resultados: 536 trabajadoras notificaron su embarazo, pero se excluyeron 86, por no disponer de la variable “duración de la prestación”. El análisis de los datos mostró una $p > 0,05$ en todos los contrastes de hipótesis, excepto en la relación entre duración de prestación y guardias presenciales vs localizadas ($p = 0,052$).

Conclusiones: Ligera asociación entre las guardias presenciales vs localizadas y los días de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo.

Palabras clave: Mujeres embarazadas; mujeres trabajadoras grupos de riesgo.

Material and Methods: Descriptive and cross-sectional study. The pregnant workers studied were the ones who notified their gestation from January 1, 2017 to December 31, 2018 of the SNS-O. The variables collected were: work center, profession, type of contract, type of guards, and their relationship with the duration of the risk benefit during pregnancy.

Results: 536 workers notified their pregnancy, but 86 were excluded, because they did not have the variable “duration of benefit”. The analysis of the data showed a $p > 0.05$ in all hypothesis contrasts, except in the relationship between benefit duration and presence vs localized guards ($p = 0.052$).

Conclusions: Slight association between presence vs localized guards and the days of suspension of the employment contract due to risk during pregnancy.

Keywords: Pregnant women; women, working; risk groups.

Fecha de recepción: 16 de abril de 2020

Fecha de aceptación: 11 de junio de 2020
