

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS S.A.M.U.R. - PROTECCION CIVIL

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN ANTE LA SOLICITUD DE UN TRASLADO A UN PACIENTE CON VIRUS DE EBOLA

El siguiente procedimiento regula la operativa a seguir en el caso de una solicitud de traslado de un paciente con una posible infección de virus Ébola desde uno de los aeropuertos de Madrid (Barajas Adolfo Suárez, o Torrejón)

Ante esa solicitud, la Central de Comunicaciones activará a los siguientes recursos:

- Supervisor de guardia que activará el procedimiento y se desplazará hasta el punto.
- TATS de Procedimientos Especiales de guardia (QUEBEC).
- Unidad Asistencial de SVA, para realizar el traslado; si es posible, con un Especialista en su dotación

Así mismo, se comunicará con la Mesa de Transporte del Servicio del Madrileño de Salud para alertar y confirmar el traslado del paciente al hospital de Universitario de La Paz.

Tras ser activado, el Recurso QUEBEC

- Informará a su responsable orgánico inmediatamente superior de la División de Procedimientos Especiales.
- El QUEBEC solicitará al LIMA (o VICTOR en horario nocturno) la activación de la segunda respuesta, si no cuenta en su dotación con más de dos especialistas y se pueden hacer cargo del vehículo.
- Los recursos de la segunda respuesta se incorporarán en Base 0, y serán distribuidos entre la unidad asistencial y la línea de la descontaminación.
- Se equipará al personal con traje buzo nivel II (tipo 2, 3), con máscara con filtro polivalente, botas de protección NRBQ y guantes. La máscara estará sellada con cinta americana. Para el vestido, se contará con un segundo especialista de su dotación, o esperará a la llegada de la segunda respuesta.
- Aportará y colocará el saco de evacuación al paciente, acompañando a la dotación durante el traslado.
- El saco se preparará con filtrado de entrada y salida del aire.
- Una vez finalizada la intervención descontaminará a la dotación:
 - o Naranja utilizando lejía doméstica sin diluir aplicada con fumigadora;
 - o Amarillo aclarando con agua;
 - o Blanco, retirando el traje y, posteriormente, con retirada del uniforme en otra dependencia (se retirará a otra dependencia) contigua, (para retirarse el uniforme); y proporcionando un traje tipo 5, 6 con calzas, para que accedan al vestuario, para ducharse.
- Una vez finalizada la descontaminación de la dotación, El Quebec será descontaminado por 1 especialistas de su dotación, o de la segunda respuesta, dotada de traje nivel II (tipo 2,3) con elemento autofiltrante FFP-2 ó 3. Se realizará el mismo procedimiento que con la dotación.

La Unidad Asistencial:

- Se equipará con traje buzo nivel II (tipo 2, 3), con máscara con filtro polivalente, botas de protección NRBQ y guantes. La máscara estará sellada con cinta americana, según las indicaciones del QUEBEC, EXCEPTO el Técnico-Conductor del vehículo que deberá permanecer, en lo posible, sin contacto con el afectado y que se equipará con traje antisalpicaduras nivel I (tipo 5, 6), guantes, calzas y elemento autofiltrante FFP-3.
- Realizará una valoración del paciente con anterioridad a su inclusión en el saco de evacuación que consistirá solamente en la medición de la presión arterial, pulsioximetría, temperatura y electrocardiografía de las derivaciones I, II y III.
- El informe será cumplimentado por el técnico-conductor, siguiendo las indicaciones del personal facultativo.
- Una vez finalizado el traslado, la unidad se desplazará a base 0.
- El personal actuante pasará a ser descontaminados, siendo retirados los equipos de protección por los especialistas (zona preparada del almacén de catástrofes). Se retirará el uniforme se le dotará de un mono antisalpicaduras para desplazarse a la ducha en los vestuarios.
- El vehículo pasará a inoperativo, quedando pendiente su limpieza.

El Supervisor de Guardia:

- Llevará un traje de protección antisalpicaduras en todo momento, nivel I (tipo 5, 6), guantes, calzas y elemento autofiltrante FFP-3.
- Se responsabilizará del cumplimiento de cada una de las partes.
- Informará al Directivo de guardia de semana.
- Se personará en el punto y en el hospital de traslado.